



# 藥品異動(新藥)公告

107年07月23日  
第107-68期  
藥劑科發布

藥品外觀	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
		
藥品代碼	MILEV	
藥品名稱 中文名 廠牌/健保碼	NOREPINEPHRINE INJECTION 諾比奈芬注射液 台裕化學製藥/AC55025219	LEVOPHED BITARTRATE 力復非他注射液 新加坡商赫士睿/ BC22013219
劑型/規格	NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4mg/ml*4ml	
外觀描述	注射劑(amp)	
治療分類	Cardiovascular system	
適應症	急性低血壓、心跳停止。	
用法用量	<p>Initial: 8 to 12 mcg/minute; titrate to desired response. Usual maintenance range: 2 to 4 mcg/minute; dosage range varies greatly depending on clinical situation. If patient remains hypotensive despite large doses, evaluate for occult hypovolemia and provide fluid resuscitation as appropriate.</p> <p>ACLS dosing range (weight-based dosing): Post cardiac arrest care: Initial: 0.1 to 0.5 mcg/kg/minute (7 to 35 mcg/minute in a 70 kg patient); titrate to desired response (AHA 2010)</p> <p>Sepsis and septic shock (weight-based dosing): Range from clinical trials: 0.01 to 3 mcg/kg/minute (0.7 to 210 mcg/minute in a 70 kg patient) (Hollenberg 2004)。 (UpToDate 資料)</p>	
給藥途徑	IV infusion	
常見副作用	心跳過慢(反射性)、頭痛、心悸、不安、怕光、嘔吐、高血糖，以及外滲 (extravasation)之後會導致組織壞死。	



# 藥品異動(新藥)公告

給藥注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果發生外滲如(皮膚腫脹，硬化)，要馬上停止輸注，且要儘早使用含 5mg 至 10mg 的 phentolamine 10~15ml 的生理食鹽水浸潤注射部。</li><li>2. 本品溶液變色或有沈澱物，不得再使用之。</li><li>3. 輸注時，儘可能注射較大靜脈的部位，而且要經常變換注射部位，將壞死的危機減至最低。</li><li>4. 當使用 norepinephrine 時，要維持充足的血容量，以便防止這種藥物之血管收縮作用所造成的組織缺血。</li><li>5. <b>不可單獨輸注生理食鹽水</b>，因為氧化與失去效力會迅速產生，宜使用 5% dextrose 做基礎劑。</li></ol>
懷孕/授乳分級	C 級/ It is not known if norepinephrine is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering norepinephrine to nursing women.
備註	<b>因新加坡商赫士睿廠商藥品已恢復正常供貨，故待替代藥品 NOREPINEPHRINE INJECTION 用罄，遂換回原廠藥品使用。</b>