



藥品異動(新藥)公告

108年01月16日
第108-06期
藥劑科發布

	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品外觀		
藥品代碼	MIERBH	MIERBH
藥品名稱 中文名	PHARMORUBICIN INJ 50MG 泛艾徽素靜脈注射劑	EPICIN 50MG 益彼欣注射液
廠牌/健保碼	輝瑞藥品/BC19120229	東洋藥品/AB47003240
劑型/規格	EPIRUBICIN HCL 50MG	EPIRUBICIN HCL 50MG
外觀描述	玻璃小瓶裝	玻璃小瓶裝
治療分類	L01DB03 ANTINEOPLASTIC AGENTS	
適應症	Breast cancer, Adjuvant therapy for axillary node-positive disease。	
用法用量	I. V: Adult: 100-120mg/m ² per 3- or 4-week treatment cycle; Max. dose: < total cumulative doses of 900mg/m ² II. 1. Liver disease (bilirubin 1.2-3mg/dL or AST 2-4X ULN): 50% of starting dose; (bilirubin> 3mg/dL or AST> 4X ULN): 25% of starting dose. 2. Scr> 5mg/dL: consider lower dose.。	
給藥途徑	僅得以靜脈注射或膀胱內給藥，不得以肌肉、皮下或口服投與途徑投藥。	
常見副作用	脫髮、搔癢、腹瀉、黏膜發炎、噁心嘔吐、昏睡、Anemia, Leukopenia, Neutropenia, Thrombocytopenia, Amenorrhea	
給藥注意事項	Epirubicin 僅得以靜脈注射或膀胱內給藥方式投與，不得以肌肉、皮下或口服投與途徑投藥。 膀胱內給藥 治療膀胱乳突狀過渡癌細胞，建議給予輸注 50mg 八週之治療方式。在產生	



藥品異動(新藥)公告

	<p>局部毒性（化學性膀胱炎）的病人，建議降低劑量至 30mg，對於治療身體上的癌組織，乃依據各個病人對本品的耐受性，劑量可增加至 80mg。為預防切除尿道的表淺腫瘤的再發，投與 50mg 四星期後，建議並接受給予 11 個月輸注以相同的劑量。本品不應使用於曾接受抗癌藥物治療及放射性治療而引起骨髓抑制的病人。</p> <p>現有或曾有心臟功能不全病史者，一般亦為本品投與之禁忌。投與 Mitozantrone、Mitomycin C 或 Anthracycline 類化合物，如：Doxorubicin、Daunorubicin，達最高累積劑量的病人。</p>
懷孕/授乳分級	D 級/在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。。(仿單內容)
備註	原輝瑞藥廠生產之藥品 PHARMORUBICIN INJ 50MG 廠商缺貨, 故以臺灣東洋藥品生產之 EPICIN INJ 50MG 暫時替代使用。待輝瑞藥廠生產之藥品 PHARMORUBICIN INJ 50MG 恢復供貨。