



藥品異動(新藥)公告

108年10月11日
第108-100期
藥劑科發布

藥品外觀	舊藥樣品	新藥樣品
	舊藥袋商品名格式	新藥袋商品名格式
		
藥品代碼	MILEV2	MILEV
藥品名稱	Levophed	Norepinephrine
中文名	力復菲德注射液	諾比奈芬注射液
廠牌/健保碼	新加坡商赫士睿/ BC25322219	台裕化學製藥/ AC55025219
劑型/規格	Norepinephrine 4mg/4mL/vial	Norepinephrine 4mg/4mL/amp
外觀描述	深色 vial 瓶	褐色 amp 瓶
治療分類	$\alpha \beta$ -adrenergic agonists	
適應症	急性低血壓、心跳停止	
用法用量	<p>Norepinephrine bitartrate 注射液是一種強效性的濃縮藥物，輸注前先用含葡萄糖溶液稀釋，本品應注射於大靜脈。</p> <p>Hypotension/shock：Continuous IV infusion Initial：8 - 12 mcg/minute Usual maintenance：2 - 4 mcg/minute Range from clinical trials：0.01 - 3 mcg/kg/minute(依照病患狀況調整)</p>	
給藥途徑	IV	
常見副作用	<ol style="list-style-type: none"> 心臟血管系統：血壓上升與心律不整，可能造成反射性心率減慢。 神經系統：焦慮、短暫性的頭痛。 	
給藥注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 避免高血壓： 因為本品之效力及個人對血壓升高劑的反應不等，本品使用過量可能會產生危險性的高血壓，因此最好從開始用藥時每2分鐘記錄一次血壓，直至獲得需要的血壓，如若仍需持續用藥則每5分鐘測一次血壓。注射本品時，要經常注意流速，且病患不可沒人照顧。頭痛可能是劑量過高產生高血壓之症狀。 注射部位： 本品儘可能注射於大靜脈，特別是肘前靜脈，注射於此靜脈因為長時間的血管收縮而造成上層皮膚壞死的危險極少。 	



藥品異動(新藥)公告

	<p>3. 溢出： 要隨時檢查注射部位之血流是否流暢，小心避免本品溢出到組織中，因血管收縮作用會使局部組織壞死。</p>
懷孕/授乳分級	C 級/尚未知道是否存在母乳中。製造商建議使用於母乳喂養的婦女時要格外注意。
備註	原輝瑞經銷之 Levophed inj，因製造廠排程生產銜接不及，故暫時缺貨，且預計可恢復供貨時間尚未確立，故待舊品用罄，改以台裕化學製藥生產的 Norepinephrine 替代使用。待原廠恢復正常供貨後即換回。