





藥品異動(新藥)公告

106年12月06日
第106-107期
藥劑科發布

藥品外觀	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
		
藥品代碼	MIVAN	
藥品名稱 中文名 廠牌/健保碼	VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION 泛可黴素注射劑 新加坡商赫士睿/ BC21845277	VANCO POWDER FOR INJECTION 安克乾粉注射劑 安克乾粉注射劑/ AC37290277
劑型/規格	Vancomycine 500mg/vial	
外觀描述	乾粉注射劑	
治療分類	Antiinfectives for systemic use / Antibacterials for systemic use	
適應症	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎	
用法用量	<p>1. 成人：每天靜脈注射劑量 2g，可每 6 小時 500mg 或 12 小時 1g，每種劑量給予時間要超過 60 分鐘，其他的因素如年齡、肥胖可能要調節劑量。</p> <p>2. 兒童：每天靜脈注射的劑量，依 40mg/kg 的比例計算，可以分開或合併到兒童 24 小時體液的需要量。每一劑量投與的時間至少要 60 分鐘以上。</p> <p>3. 嬰幼兒和新生兒：在嬰幼兒和新生兒方面，每天靜脈注射的總劑量很低，最初劑量建議 15mg/kg，一星期大的新生兒每 12 小時 10mg/kg，一個月大的嬰兒每 8 小時 10mg/kg。並且密切追蹤血清中 Vanco 的濃度，保證嬰幼兒及新生兒的安全。</p> <p>4. 經由 Intrathecal(腰椎或 Intraventricular)的輸注泛可黴素的安全性和效力尚未建立。</p> <p>5. 腎功能不全和年老者：腎功能不全者，應調整劑量。</p>	
給藥途徑	靜脈注射	
常見副作用	靜注投與有寒顫、潮紅及發燒現象，口服投與有噁心現象。嚴重者-腎毒性、耳毒性、急性過敏反應。	



藥品異動(新藥)公告

給藥注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 所有接受本品的病人要定期做血液研究，尿液分析，肝及腎功能試驗。2. 儘可能用間歇的靜脈滴注投與。用 10ml 注射用水來稀釋注射用粉，然後加到 100~200ml 的滴注液中，每 6 小時 1 次，注射時間 20~30 分以上。3. 滴注時要避免外溢，否則會發生嚴重刺激和壞死。
懷孕/授乳分級	C 級/ Vancomycin is present in breast milk following IV administration. Vancomycin exhibits minimal oral absorption; therefore, the amount available to pass into the milk would be limited following oral administration and any amount present in breast milk is unlikely to reach the bloodstream of a breastfed infant.
備註	<p>健保給付規定：</p> <p>10.8.1. Vancomycin : (88/3/1)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 對其他抗生素有抗藥性之革蘭氏陽性菌感染。2. 病患對其他抗生素有嚴重過敏反應之革蘭氏陽性菌感染。3. 治療抗生素引起之腸炎(antibiotics-associated colitis)，經使用 metronidazole 無效者始可使用口服 vancomycin。4. vancomycin 10 gm(溶液用粉劑)限骨髓移植病例使用。5. 其他經感染症專科醫師認定需使用者。