



藥品異動(新藥)公告

107 年 04 月 18 日
第 107-41 號
藥劑科發布

藥品外觀	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品代碼	MIHPVH
藥品名稱 <u>中文名</u>	Gardasil 9 Vaccine 九價人類乳突病毒(第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 型) 基因重組疫苗
廠牌/健保碼	美國默克藥廠/自費
劑型/規格	0.5ml/ Syringe
外觀描述	預充填式針劑
治療分類	預防接種疫苗
適應症	1. GARDASIL 9 為一適合 9-26 歲之女孩及女性施打的疫苗，可用以預防下列由人類乳突病毒(HPV)所引起的病變： • 第 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的子宮頸癌 • 第 6 及 11 型 HPV 所引起的生殖器疣(尖型濕疣) • 第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的第 1 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN 1)、第 2 級與第 3 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN 2/3) • 第 6, 11, 16, 18 型 HPV 所引起的子宮頸原位腺癌(AIS)、第 2 級與第 3 級外陰上皮內贅瘤。(VIN 2/3)、第 2 級與第 3 級陰道上皮內贅瘤(VaIN 2/3)
用法用量	用量肌肉注射的方式各施打一劑 0.5 毫升的劑量：0、2 個月、6 個月
給藥途徑	肌肉注射
常見副作用	常見之副作用為發燒及注射部位的紅疹、出血、疼痛、搔癢、腫脹
給藥注意事項	1. 暈厥:由於接種疫苗的人可能會發生暈厥的現象，有時並會導致跌倒受傷，因此，建議施打疫苗後應觀察 15 分鐘。 2. 過敏反應的處置:應備妥適當的醫療及監督措施，以因應接種 GARDASIL 9 後發生過敏性反應。
懷孕/授乳分級	B 級/哺乳安全性：目前並不確知 GARDASIL 9 是否會分泌進入人類的乳汁，因此，對授乳婦女施打 GARDASIL 9 時應謹慎。
備註	106-1 藥委決議:同意引進此項藥品，並刪除 2 價及 4 價之子宮頸疫苗。