藥品異動(新藥)公告

107 年 06 月 19 日
第 107-56 期
藥劑科發布

	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品外觀		
藥品代碼	MTTRZ	
藥品名稱 中文名 廠牌/健保碼	HYTRIN 2MG TABLETS 定脈平錠 美商亞培/BC1764100	TERADRIN TABLETS 2MG 暢流錠 健喬信元/AC43188100
劑型/規格	TERAZOSIN 2mg/tab	
外觀描述	淺紅橙 圓扁形錠劑 S,Y/TERADRIN 具剝痕	
治療分類	Drugs used in benign prostatic hypertrophy / Alpha-adrenoreceptor antagonists	
適應症	高血壓、良性攝護腺肥大症。	
用法用量	1.良性前列腺增生症：口服：最初：睡前 1 毫克;此後，如果需要，在數週內向上滴定，平衡治療益處與特拉唑嗪誘導的體位性低血壓;大多數患者每天需要 10 毫克;如果在 10mg /天的 4 至 6 週後沒有反應，可以增加至 20mg /天（最大值：20mg /天）。 2.高血壓（替代藥物）：口服：初始：每日 1mg;根據患者的反應，按 1 或 2 次分劑量）每日劑量 20 mg 進行滴定。注意：睡前給藥可能有助於限制正位。 3.輸尿管結石（遠端）(非標籤使用)：口服：在就寢時間 2 至 5 毫克，長達 2 週或直至石塊排出;可用作衝擊波碎石的輔助治療。（資料來源:UpToDate）	
給藥途徑	口服	
常見副作用	1.Cardiovascular: Orthostatic hypotention, palpitations, peripheral edema, syncope, tachycardia 2.Central nervous system: Dizziness, drowsiness, myasthenia, paresthesia, vertigo 3.Endocrine & metabolic: Decreased libido, weight gain	

藥品異動(新藥)公告

	4.Gastrointestinal: Nausea 5.Genitourinary: Impotence 6.Neuromuscular & skeletal: Back pain, limb pain 7.Ophthalmic: Blurred vision 8.Respiratory: Dyspnea, nasal congestion, sinusitis
給藥注意事項	1. CNS 抑鬱症：可能導致中樞神經系統抑鬱症，這可能會損害身體或智力能力;必須警惕患者執行需要精神警覺的任務（例如，操作機器或駕駛）。 2. 體位性低血壓/暈厥：可能導致明顯的直立性低血壓和暈厥，尤其是首次或首次治療的幾天。
懷孕/授乳分級	C 級/尚不知道 TERAZOSIN 是否會分泌到乳汁中，因許多藥品會分泌到乳汁中，故授乳婦在服用本品應小心。
備註	美商亞培之藥品 Hytrin 2mg/tab 因國外廠生產線供貨,故暫以健喬信元生產之 TERADRIN TABLETS 2MG 替代使用