藥品異動(新藥)公告

107 年 12 月 14 日
第 107-125 期
藥劑科發布

	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品外觀		
藥品代碼	MTAPZ5	
藥品名稱 中文名 廠牌/健保碼	XANAX TABLETS 0.5MG 贊安諾錠 輝瑞大藥廠/BC211401G0	ALPRAZOLAM TABLETS 0.5MG 安邦錠 中化裕民/ AB577401G0
劑型/規格	ALPRAZOLAM 0.5mg	
外觀描述	錠劑橢圓形粉紅色 UPJOHN/55 一字刻痕	錠劑橢圓形粉紅色 CCP/C60 一字刻痕
治療分類	Anxiolytic agent	
適應症	焦慮狀態。	
用法用量	1.通常開始劑量：0.25～0.5MG，每日三次。 2.通常每日總劑量範圍：每日 0.5～4.0MG，平分數次服用。 3.中止治療: 應緩慢降低劑量，建議本品每日劑量的降低應不超過每三日 0.5MG，有些病人可能需要更為緩慢地降低劑量。	
給藥途徑	口服	
常見副作用	最常見副作用為昏昏欲睡與頭重腳輕(頭昏眼花)。較不常見副作用為視覺模糊、頭痛、抑鬱、失眠、神經質(焦慮)、震顫、體重改變、記憶力受損(健忘)，協調障礙，多種胃腸道症狀，以及自主神經系統障礙表徵。	
給藥注意事項	若干病人服用推薦(或較高)劑量之本劑一段時間後(例如一週至四個月)，如突然停藥或迅速減量曾有禁斷症狀發作之報導。故本劑之劑量應逐漸遞減或漸漸停藥。	
懷孕/授乳分級	D 級/ Alprazolam is present in breast milk. Breastfeeding is not recommended by the manufacturer. If a benzodiazepine is needed in breastfeeding females,	

藥品異動(新藥)公告

	use of shorter acting agents is preferred.
備註	原輝瑞大藥廠生產之藥品 XANAX TAB 0.5mg 廠商由於國外製造廠排程延遲導致缺貨之因,故暫以中化裕民生產之 ALPRAZOLAM TAB 0.5mg 替代使用,待原廠恢復供貨正常供貨,再換回原廠藥品使用。