



# 藥品異動(新藥)公告

108年01月07日  
第108-02期  
藥劑科發布

	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品外觀		
藥品代碼	MITXXC	MITXXB
藥品名稱 中文名 廠牌/健保碼	Tetanus Toxoide INJ 明礬沉澱破傷風類毒素 國光/ J000089209	TETANA (Tetanus vaccine) 0.5ML 破傷風類毒素疫苗 IBSS BIOMED/ X000176206
劑型/規格	Tetanus toxoid	
外觀描述	10LF/ml, 2 dose/1ml/vial	1dose(0.5ml) /amp
治療分類	BIOLOGIC AND IMMUNOLOGIC AGENTS	
適應症	預防破傷風。	
用法用量	<p>深層皮下注射，一般於高位上臂肌肉(三角肌)接受注射。本品嚴禁血管內注射。</p> <p>基礎免疫： 基礎免疫一共需接種三次。 第一和第二次接種，每次劑量 0.5mL，兩次間隔 4-6 週。 第三次接種，每次劑量 0.5mL，於第二次接種後 6-12 個月進行。</p> <p>追加免疫： 近十年內無接種過含破傷風類毒素成分之疫苗者，接種一次進行追加免疫，每次劑量 0.5mL。</p>	
給藥途徑	IM，深層皮下注射	
常見副作用	發燒、皮膚紅腫、注射部位疼痛、倦怠。	



# 藥品異動(新藥)公告

<b>給藥注意事項</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 對破傷風或對疫苗內其他成分過敏者。過敏症狀可能包含：發癢的皮疹、呼吸困難、臉部與舌頭腫脹。</li><li>2. 急性發熱性疾病。有輕度感染，如一般感冒症狀時，不是接種禁忌，但應事先告知醫師。</li><li>3. 慢性疾病在惡化階段。應延後接種，直到病情好轉。</li><li>4. 疑似感染潛伏期(破傷風除外)。</li><li>5. 曾經發生過血小板減少，接種後會增加出血、瘀血或神經系統不適的風險。醫師應評估任何接種禁忌與感染破傷風之間的風險。</li></ol> 冷藏儲存於 2~8°C，嚴禁凍結，若有凍結須丟棄
<b>懷孕/授乳分級</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在懷孕前接受一劑或兩劑疫苗的婦女應在懷孕期間完成疫苗接種計劃。</li><li>2. 懷孕期間若有必要，距上次接種已超過十年者，應追加接種一劑。</li></ol>
<b>備註</b>	原國光之明礬沉澱破傷風類毒素停產,故以專案進口國光代理 IBSS BIOMED 生產之 TETANA (Tetanus toxoid) 0.5ML/AMP 替代使用。