

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
友復膠囊	UFUR	Tegafur/Uracil	100/224 毫克

二、作用：

本藥是一種抗癌藥物，可用於治療胃癌、大腸癌、乳癌、結腸癌、頭頸部癌等疾病。

三、如何服用本藥品：

1. 服藥的劑量及期間長短依個人及病情而異，請遵醫囑服藥。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

可能會發生下列副作用：

1. 胃部不適、嘔吐、腹瀉、胃痛、食慾不振、金屬味覺
2. 無力、疲勞、頭痛
3. 皮膚疹、色素沉澱

如果您有以下任何症狀，請**立即告知醫師**：

1. 不正常的瘀青或出血
2. 皮膚或眼睛泛黃
3. 吐血、發燒、意識不清、嚴重腸炎(強烈腹痛、下痢)
4. 暈眩、說話困難、運動失調

六、注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是 phenytoin、Methotrexate 等，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有肝及腎臟疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。治療期間請作好避孕措施，以避免受孕。
5. 未告知醫師前，請勿施打任何疫苗。
6. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。

七、藥品該如何存放？

1. 請將本藥**連同藥袋**放置於室溫（勿放於冰箱內）、陰涼乾燥處避光儲存。切勿放在小孩可以取得的地方，以防小孩誤食。
2. 持慢性病連續處方者應在藥品快用完之前就醫或續領藥品。外出或旅遊時應確認攜帶足夠藥品，並置於隨身行李，勿放在託運行李中以免遺失或因過熱、過冷而影響藥品安定。

-----本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師----- 11211 修訂

Pharmacy Department of FooYin University Hospital

輔英科技大學附設醫院藥劑科 諮詢專線:08-8323146-1268