

滅殺除癌錠用藥指導衛教單張

NO : AN3

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
滅殺除癌錠	Methotrexate	Methotrexate sodium	2.5 毫克

二、作用：

本藥為一抗代謝藥物，用於治療某些腫瘤疾病、類風濕性關節炎(可改善發炎之症狀—痛、腫、僵硬)，乾癬，或某些須要類固醇治療的疾病，“滅殺除癌”可減少類固醇所使用的量。

三、如何服用本藥品：

空腹口服，必須遵醫囑常規服藥，不可自行停藥或加量。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

不要補吃忘記的藥，也就是省略忘記的那一次藥。但若連續忘記二次以上，應回門診就醫。

五、可能產生的副作用及處理方式：

可能會發生下列副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、口腔炎、發冷或流行性感冒的症狀、掉髮、紅疹、暈眩、頭痛、打嗝。

如果您有以下任何症狀，請立即告知醫：高燒、咳嗽、呼吸困難、喘、頭痛、關節痛、疑似感染症狀、不正常的瘀青或出血、血便、血尿、意思不清、昏迷、癲癇、頭頸部僵直疼痛、。

六、注意事項：

- 1.治療期間請勿飲酒，酒精可能會增加對肝臟的傷害。
- 2.治療期間，若無請教過醫師，請勿注射或口服疫苗。
- 3.避免過度的曝曬於陽光下或燈泡的照射，可使用含防曬系數 15(SPF15)的產品來防曬，若有灼傷，請向醫師諮詢。
- 4.不要併服 Aspirin 或 Ibuprofen 類之藥物，若必須服用，請諮詢您的醫師。
- 5.若病人服用其他藥品，須向醫生或藥師諮詢。
- 6.如果您是孕婦、準備懷孕或是哺乳中，請在使用前告知醫師。
- 7.服用前，應先告知醫師目前你正服用的其他藥品或成藥。

七、藥品該如何存放？

- 1.請將本藥連同藥袋放置於室溫（勿放於冰箱內）、陰涼乾燥處避光儲存。切勿放在小孩可以取得的地方，以防小孩誤食。
- 2.持慢性病連續處方者應在藥品快用完之前就醫或續領藥品。外出或旅遊時應確認攜帶足夠藥品，並置於隨身行李，勿放在託運行李中以免遺失或因過熱、過冷而影響藥品安定。

-----本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師-----11211 修訂