

隆我心錠用藥指導衛教單張

NO : CV2

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
隆我心錠	Lanoxin	Digoxin	0.25 毫克

二、作用：

本藥能增加心臟收縮能力及減緩房室傳導速率,主要用來治療心臟衰竭及心律不整。

三、如何服用本藥品：

- 1.請遵照醫師處方服用。
- 2.通常一天只需服用一次，為避免忘記服藥，最好每天固定在同一時間服藥。
- 3.任何情況下不可未經醫師同意而任意自行停藥或增減藥量。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

當天想起時應儘快補服，但如已接近下次服藥時間（如：過了晚餐時間），則不再補服，只要在下一次用藥時間正常服藥即可，切勿於隔天將兩次的藥量一起服用。

五、可能產生的副作用及處理方式：

- 1.若下列症狀持續或嚴重時，請回門診就醫：心跳不規則、眩暈、皮膚發疹或癢、視力模糊或黃綠視覺（視覺物體周圍有黃綠色色圈）、對光敏感、疲倦想睡、肌肉無力等。
- 2.若發生下列症狀時應立即就醫：胃腸不適、噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、手腳水腫、呼吸困難。

六、注意事項：

- 1.服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：曾對藥物過敏、懷孕或準備懷孕、哺乳、最近是否有任何手術及其他疾病（如肝臟、腎臟、心臟等）或目前正在使用的其他藥物。
- 2.服用本藥期間，應定期監測心跳速度、電解質（尤其是鉀離子）、心電圖及腎臟功能。
- 3.開始服藥後，若因其它疾病就醫(如看牙科或需手術時)，請告知醫師您正在服用本藥。
- 4.服用本藥可能讓您感覺頭昏想睡。除非您已確定本藥品對您的影響，否則請避免從事容易引起傷害的危險性活動(如：開車、操作機械。)
- 5.請勿將本藥拿給別人服用。

七、藥品該如何存放？

- 1.請將本藥連同藥袋放置於室溫（勿放於冰箱內）、陰涼乾燥處避光儲存。切勿放在小孩可以取得的地方，以防小孩誤食。
- 2.持慢性病連續處方者應在藥品快用完之前就醫或續領藥品。外出或旅遊時應確認攜帶足夠藥品，並置於隨身行李，勿放在託運行李中以免遺失或因過熱、過冷而影響藥品安定。

----- 本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師----- 11211 修訂