

百無凝膜衣錠用藥指導衛教單張

NO : CV8

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
百無凝膜衣錠	Brilinta	Ticagrelor	90 毫克

二、作用：

防止血栓形成，以降低中風、心臟病發作、或對接受經皮冠狀動脈介入治療者，減少支架栓塞的發生。

三、如何服用本藥品：

1. 通常每日服用 2 次，飯前或飯後皆可，請固定時間服用。
2. 請遵照醫師處方服用，任何情況下不可未經醫師同意而任意自行停藥或增減藥量。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。若未能在下一劑量之前至少 6 小時補服藥物，即應跳過該劑量，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

1. 此藥導致的副作用並不常見，若下列症狀持續或嚴重時，請回門診就醫：極度疲倦、頭痛、頭暈、胃痛、腹瀉、喉嚨痛、發燒。
2. 若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：皮膚紅疹、蕁麻疹、呼吸或吞嚥困難、視覺喪失、發燒、眼睛或皮膚變黃、不尋常出血(例如:瘀傷、血腫、流鼻血、血尿、胃腸道出血、解黑便)。

六、注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有肝臟、血液方面、出血性潰瘍等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
6. 如果您計劃接受手術治療及檢查（例如:牙科、外科等），請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。
7. 服藥期間盡量不要和葡萄柚汁併用，因葡萄柚汁可能會增加本藥的作用。

七、藥品該如何存放？

1. 請將本藥連同藥袋放置於室溫（勿放於冰箱內）、陰涼乾燥處避光儲存。切勿放在小孩可以取得的地方，以防小孩誤食。
2. 持慢性病連續處方者應在藥品快用完之前就醫或續領藥品。外出或旅遊時應確認攜帶足夠藥品，並置於隨身行李，勿放在託運行李中以免遺失或因過熱、過冷而影響藥品安定。

-----本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師----- 10311 修訂