

Fentanyl transdermal patch

"管制藥品廠" 吩坦尼 穿皮貼片劑 Fentanyl Transdermal Patch 25µg/h、50µg/h "PPCD"

病患指導

- ◇ 依醫師指示貼在適合的位置，如前胸、後背、上半臂、大腿等平坦處（不需要痛哪裡貼哪裡）。
- ◇ 請避開傷口和放射線治療部位。
- ◇ 每 2-3 天換片一次（依醫師指示），請每次換貼不同部位。
- ◇ 避免泡熱水澡，或將貼片直接接觸熱源，例如熱水袋、電毯。
- ◇ 第一次使用貼片不可馬上停用原止痛藥（請依指示慢慢停）。
- ◇ 如有突然發生的疼痛，再加貼片不會立刻止痛，應加服其他需要時服用的止痛藥。
- ◇ 雖然可能偶有噁心嘔吐，可使用輔助藥物避免之（勿放棄）。
- ◇ 偶有輕微紅疹癢情形，不須太擔心，請告知醫護人員。
- ◇ 如有嗜睡、呼吸減少或困難，請立即通知醫護人員。

特別注意事項：

為維護病人的使用權利，請遵循以下事項

1. 請務必填寫記錄表（貼上及撕下的日期時間），並簽名。
2. 用過的貼片請對折放入回收袋。
3. 回診時由醫師簽章，並於領藥時繳回（記錄表及貼片）。
4. 依管制藥品管理條例，如短缺需說明，否則不得再處方。



使用須知

【使用前準備】

- ▶ 於上軀幹或上半臂上找一塊無刺激及無放射線照射的平整皮膚表面。對年紀較小的兒童而言，上背部為較理想的部位，因兒童移貼片的可能性最低。
- ▶ 使用貼片前，要將貼藥部位（最好是無毛髮生長的區域）的毛髮剪除（勿用刮除方式剃除）。
- ▶ 如於使用貼片前，欲清潔吩坦尼穿皮貼片劑貼與部位的皮膚，用清水潔淨即可。不能使用肥皂、油乳液或任一其它會刺激皮膚或改變膚質的物質。
- ▶ 貼上貼片之前，應使皮膚完全乾燥。



【使用方法】

- ◇ 從密封包裝內取出吩坦尼穿皮貼片劑。
（取出後應立即使用）

- ◇ 先將貼片保護層移除。



- ◇ 再將貼片貼上皮膚，並用手掌用力緊壓30秒確保整片貼片完全與皮膚接觸，尤其要注意角落部位應緊密黏貼，避免碰到貼片的黏著層。



- ◇ 貼上後以清水洗手。

【使用後處置】

- ▶ 使用過的吩坦尼穿皮貼片劑，應對黏後放入原包裝袋，繳回（醫院）藥局銷毀。
- ▶ 如有未曾使用剩下之貼片應退還（醫院）藥局。
- ▶ 貼上貼片後或移除貼片後只能用水洗手。

【警語及注意事項】

- ▶ Fentanyl 穿皮貼片劑無論使用前後，均應放置於兒童無法觸及處。
- ▶ Fentanyl 穿皮貼片劑不能分割、切開或以任何方式破壞，因為這可能會破壞Fentanyl 的緩釋劑型。
- ▶ Fentanyl 穿皮貼片劑可連續貼足72小時。新的貼片要貼在與前一片不同的位置。同一部位的皮膚必須相隔數日才可再貼上一片新貼片。