

Ellipta 吸入劑型

重要注意事項

- 此藥品無明顯氣味，不需要擔心沒有吸入藥物。
- 請勿搖晃吸入器，手指不要擋住通氣孔，也不要對著吸入器吹氣。
- 每一次使用後，劑量計數器上的數字會逐次減少。
- 如果聽到「喀嚓」聲時，劑量計數器的數字沒有減少，就無法從吸入器吸入所需的劑量，此時請帶著吸入器尋求藥師協助。
- 每次吸藥後，請用清水漱口，可以減少口咽念珠菌病的風險。

請向醫護人員查詢有關詳情，此劑量資料須由醫護人員提供給病患
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
©2025 GSK group of companies or its licensor.
不良事件通報程序：通報電話：(02)23126836/郵箱：oax40892@gsk.com
從從葛蘭素史克藥廠(股)台灣分公司 100 台北市忠孝西路一段66號23樓
詳細處方資訊請索

TRELEGY ELLIPTA

GSK

Trelegy Ellipta

(fluticasone furoate/umeclidinium /vilanterol)

吸入器使用說明

本說明書僅提供有被處方此藥品之患者
正確使用 Trelegy Ellipta 吸入器



請您務必詳閱 Trelegy Ellipta 包裝盒內的患者須知，
瞭解本藥物的重要資訊。如果對藥物有任何問題，
請隨時詢問醫師、護理師或藥師。

Pharmacy Department of FooYin University Hospital 11301 修訂
輔英科技大學附設醫院藥劑科 諮詢專線:08-8323146-1268

Ellipta 吸入劑型

如何使用

要吸藥時才可以打開蓋子，如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，就會損失一次藥物劑量。

1 打開



- 把蓋子往下推，直到聽見「喀嚓」聲。
- 吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

2 吸入



- 雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。
- 此時請以長而穩定的方式深吸一口氣，然後閉氣至少3-4秒。請勿由您的鼻子吸入。

3 關上



- 取出吸入器，慢慢吐氣。
- 將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴。
- 如有需要可使用乾面紙清潔吸口。



- 吸藥後，務必用清水漱口，且不可吞下，這是為了幫助降低發生口咽念珠菌病的風險。

請使用以下 QR Code 連結
Trelegy Ellipta 使用影片



請掃描QR code將您個人及二次藥效
資訊連結至QR碼內內容查詢

請務必詳閱患者須知，如果對藥物使用有任何問題或不確定使用方法，請洽詢醫師、護理師或藥師。

References: 1. Trelegy 92/55/22 mcg Taiwan Full PI, TW05; 2. Trelegy 184/55/22 mcg Taiwan Full PI, TW02

TRELEGY ELLIPTA
fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol

※如果成分無類固醇吸藥後無需漱口。

Pharmacy Department of FooYin University Hospital 11301 修訂
輔英科技大學附設醫院藥劑科 諮詢專線:08-8323146-1268